

Errata Band 1: Wirbeltiere

Korrekturen zur Roten Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands (2009):

Änderungen sind gelb unterlegt und betreffen lediglich die Publikation.

Seite 116 in Tab. 1 sind folgende Ergänzungen vorzunehmen:

| Deutscher Name | Rote Liste 1998 | Rote Liste 2009 |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| Ostigel | <i>Erinaceus concolor</i> | <i>Erinaceus roumanicus</i> |
| Alpenfledermaus | <i>Pipistrellus savii</i> | <i>Hypsugo savii</i> |
| Großes Mausohr | <i>Myotis myotis</i> | <i>Myotis myotis myotis</i> |
| Mückenfledermaus | <i>Pipistrellus spec.</i> , „55 kHz-Zwergfledermaus“ | <i>Pipistrellus pygmaeus</i> |
| Nymphenfledermaus | – | <i>Myotis alcathoe</i> |
| Weißrandfledermaus | – | <i>Pipistrellus kuhlii</i> |
| Rötelmaus | <i>Clethrionomys glareolus</i> | <i>Myodes glareolus</i> |
| Terrestrische Schermaus | <i>Arvicola terrestris</i> | <i>Arvicola scherman</i> |
| Aquatische Schermaus | | <i>Arvicola amphibius</i> |
| Westliche Hausmaus | <i>Mus domesticus</i> | <i>Mus domesticus domesticus</i> |
| Helgoländer Hausmaus | | <i>Mus domesticus helgolandicus</i> |
| Siebenschläfer | <i>Myoxus glis</i> | <i>Glis glis</i> |
| Mink | <i>Mustela vison</i> | <i>Neovison vison</i> |
| Seehund | <i>Phoca vitulina</i> | <i>Phoca vitulina vitulina</i> |
| Wildkatze | <i>Felis silvestris</i> | <i>Felis silvestris silvestris</i> |
| Damhirsch | <i>Cervus dama</i> | <i>Dama dama</i> |
| Mufflon | <i>Ovis orientalis</i> | <i>Ovis aries</i> |

Seite 121 Tab. 2. Bei folgenden Arten sind einzelne Eintragungen zu verändern:

| RL | V | Deutscher Name | Kriterien | | | | Risiko | RL 98 | Kat.änd. | Arealr. | Name | N |
|----|---|----------------------|-----------|-----|-----|---|--------|-------|----------|---------|--|---|
| V | | Große Bartfledermaus | mh | < | ? | = | | 2 | + M | | <i>Myotis brandtii</i> (EVERSMANN, 1845) | |
| 1 | | Nymphenfledermaus^ | ss | (<) | (↓) | – | D | | | N | <i>Myotis alcathoe</i> VON HELVERSEN & HELLER, 2001 | |
| ★ | | Weißrandfledermaus | s | = | ↑ | = | | | | N | <i>Pipistrellus kuhlii</i> (KUHL, 1817) | |
| D | | Kleinwühlmaus | mh | ? | ? | = | | V | | NO | <i>Microtus subterraneus</i> (DE SELYS-LONGCHAMPS, 1836) | |
| V | | Iltis | mh | < | ? | = | | V | = | | <i>Mustela putorius</i> LINNÉ, 1758 | |
| D | | Mauswiesel | ? | (<) | = | = | | V | | | <i>Mustela nivalis</i> LINNÉ, 1766 | |

| Kategorieänderungen | absolut | prozentual |
|--|---------|------------|
| Kategorie verändert | 28 | 29,2% |
| positiv | 17 | 17,7% |
| negativ | 11 | 11,5% |
| Kategorie unverändert | 53 | 55,2% |
| Kategorieänderung nicht bewertbar (inkl. $\blacklozenge \rightarrow \blacklozenge$) | 15 | 15,6% |
| Gesamt | 96 | 100,0% |

| Gründe für die Kategorieänderungen | | abs. | proz. |
|---|--|------|--------|
| positiv | R Reale Veränderungen | 1 | 5,9% |
| | R(Na) Reale Veränderungen durch Naturschutzmaßnahmen | 7 | 41,2% |
| | K Kenntnisszuwachs | 0 | 0,0% |
| | M Methodik | 6 | 35,3% |
| | T Taxonomische Änderungen | 0 | 0,0% |
| | gesamt mit Grund | 14 | 82,4% |
| | [leer] Grund unbekannt | 3 | 17,6% |
| | gesamt positive Änderungen | 17 | 100,0% |
| negativ | R Reale Veränderungen | 4 | 36,4% |
| | R(Na) Reale Veränderungen durch Naturschutzmaßnahmen | 0 | 0,0% |
| | K Kenntnisszuwachs | 0 | 0,0% |
| | M Methodik | 3 | 27,3% |
| | T Taxonomische Änderungen | 0 | 0,0% |
| | gesamt mit Grund | 7 | 58,3% |
| | [leer] Grund unbekannt | 4 | 36,4% |
| | gesamt negative Änderungen | 11 | 100,0% |
| alle | R Reale Veränderungen | 5 | 17,9% |
| | R(Na) Reale Veränderungen durch Naturschutzmaßnahmen | 7 | 25,0% |
| | K Kenntnisszuwachs | 0 | 0,0% |
| | M Methodik | 9 | 32,1% |
| | T Taxonomische Änderungen | 0 | 0,0% |
| | gesamt mit Grund | 21 | 75,0% |
| | [leer] Grund unbekannt | 7 | 25,0% |
| | gesamt alle Änderungen | 29 | 100,0% |
| Bilanzierung realer Veränderungen [R + R(Na)] | | abs. | proz. |
| positiv | | 8 | 47,1% |
| negativ | | 4 | 36,4% |

Arvicola terrestris (LINNÉ, 1758) p.p. → *Arvicola amphibius* (LINNÉ, 1758)
Arvicola terrestris (LINNÉ, 1758) p.p. → *Arvicola scherman* (SHAW, 1801)
[*Bos primigenus* BOJANUS, 1827 → *Bos taurus* LINNÉ, 1758]
Cervus dama LINNÉ, 1758 → *Dama dama* (LINNÉ, 1758)
[*Citellus citellus* (LINNÉ, 1766) → *Spermophilus citellus* (LINNÉ, 1766)]
Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780) → *Myodes glareolus* (SCHREBER, 1780)
Erinaceus concolor MARTIN, 1838 → *Erinaceus roumanicus* BARRETT-HAMILTON, 1900
Felis silvestris SCHREBER, 1777 → *Felis silvestris silvestris* SCHREBER, 1777
Mus domesticus SCHWARZ & SCHWARZ, 1943 p.p. → *Mus domesticus domesticus* SCHWARZ & SCHWARZ, 1943
Mus domesticus SCHWARZ & SCHWARZ, 1943 p.p. → *Mus domesticus helgolandicus* ZIMMERMANN, 1953
Mustela vison SCHREBER, 1777 → *Neovison vison* (SCHREBER, 1777)
Myotis bechsteini (KÜHL, 1817) → *Myotis bechsteinii* (KÜHL, 1817)
Myotis brandti (EVERSMANN, 1845) → *Myotis brandtii* (EVERSMANN, 1845)
Myotis myotis (BORKHAUSEN, 1797) → *Myotis myotis myotis* (BORKHAUSEN, 1797)
Myoxus glis (LINNÉ, 1766) → *Glis glis* (LINNÉ, 1766)
Ovis orientalis PALLAS, 1811 → *Ovis aries* LINNÉ, 1758
Phoca vitulina LINNÉ, 1758 → *Phoca vitulina vitulina* LINNÉ, 1758
[*Pipistrellus mediterraneus* (CABRERA, 1904) → *Pipistrellus pygmaeus* (LEACH, 1825)]
Pipistrellus savii BONAPARTE, 1837 → *Hypsugo savii* (BONAPARTE, 1837)
Pipistrellus spec. („55 kHz-Zwergfledermaus“) → *Pipistrellus pygmaeus* (LEACH, 1825)
[*Vespertilio discolor* NATTERER in KÜHL, 1817 → *Vespertilio murinus* LINNÉ, 1758]