

Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Lamproderma atrosporum agg.
Organismengruppe Schleimpilze
Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet
Verantwortlichkeit Deutschlands Allgemeine Verantwortlichkeit
Aktuelle Bestandssituation selten
Langfristiger Bestandstrend gleich bleibend
Kurzfristiger Bestandstrend gleich bleibend
Vorherige Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Kategorie unverändert
Kommentar zur Taxonomie Formenreiche Gruppe vermutlich asexueller Kleinarten, die nach molekularbiologischen Befunden (Fiore-Donno et al. 2008) in eine eigene Gattung (Meriderma) zu stellen ist. Alle zu Meriderma gehörenden Arten sind gut durch die trichterartig verbreiterten Capillitium-Enden kenntlich. Poulain et al. (2011) unterscheiden im Lamproderma atrosporum agg. drei Arten, Meriderma carestiae (Ces. & de Not.) Mar. Mey. & Poulain, M. echinulatum (Meyl.) Mar. Mey. & Poulain und M. cribrarioides (Fr.) Mar. Mey. & Poulain. Die Kenntnisse zur Verbreitung der Arten dieser Gruppe in Deutschland sind gegenwärtig noch nicht ausreichend, um sie in dieser Liste differenziert zu behandeln.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Schnittler, M.; Kummer, V.; Kuhnt, A.; Kriegelsteiner, L.; Flatau, L.; Müller, H. & Täglic, U. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Schleimpilze (Myxomycetes) Deutschlands. – In: Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 6: Pilze (Teil 2) – Flechten und Myxomyzeten. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (6): 125-234.

