


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Physarum virescens Ditmar
Organismengruppe Schleimpilze
Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet
Verantwortlichkeit Deutschlands Allgemeine Verantwortlichkeit
Aktuelle Bestandssituation mäßig häufig
Langfristiger Bestandstrend gleich bleibend
Kurzfristiger Bestandstrend gleich bleibend
Vorherige Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Kategorie unverändert
Weitere Kommentare Bevorzugt dicke Moospolster (z.B. Dicranum sp.) am Boden; gern in lichten, relativ trockenen Kiefernwäldern. Ein Nachweis von Müller (2007) an Streu von Calluna. Durch die kräftig grünlichgelbe Farbe der sich bildenden Fruchtkörper kurzzeitig sehr auffällig, reife Fruchtkörper sind dagegen leicht zu übersehen. Deutlich häufiger in borealen Wäldern.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Schnittler, M.; Kummer, V.; Kuhnt, A.; Krieglsteiner, L.; Flatau, L.; Müller, H. & Tägliche, U. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der Schleimpilze (Myxomycetes) Deutschlands. – In: Ludwig, G. & Matzke-Hajek, G. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 6: Pilze (Teil 2) – Flechten und Myxomyceten. – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (6): 125-234.