

# Artensteckbrief



<p><b>Wissenschaftlicher Name</b> Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)</p> <p><b>Deutscher Name</b> Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter</p> <p><b>Organismengruppe</b> Tagfalter und Widderchen</p>
<p><b>Rote-Liste-Kategorie</b> Stark gefährdet</p>
<p><b>Verantwortlichkeit Deutschlands</b> Allgemeine Verantwortlichkeit</p>
<p><b>Aktuelle Bestandssituation</b> selten</p>
<p><b>Langfristiger Bestandstrend</b> starker Rückgang</p>
<p><b>Kurzfristiger Bestandstrend</b> starke Abnahme</p>
<p><b>Vorherige Rote-Liste-Kategorie</b> Stark gefährdet</p>
<p><b>Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste</b> Kategorie unverändert</p>
<p><b>Kommentar zur Gefährdung</b> P. serratulae besiedelt störungsreiche, lückige und großflächige Magerrasen in den Mittelgebirgen und auf den Almen in den Alpen (Bolz 2020). Außerhalb der Alpen ist er in vielen Gebieten stark rückläufig oder bereits verschwunden. In den Alpen (z.B. Nagelfluhkette und Mangfallgebirge) ist die Art stabil, Abnahmen sind jedoch auf niedriger gelegenen Almen zu verzeichnen. Gefährdungsfaktoren sind die Verbuschung von Habitaten wie Almweideflächen und Magerrasen mit Felsstandorten sowie Stickstoffeintrag durch Düngung.</p>
<p><b>Einbürgerungsstatus</b> Indigene oder Archäobiota</p>
<p><b>Quelle</b> Musche, M.; Albrecht, M.; Becker, J.; Bittermann, J.; Blanckenhagen, B. von; Böck, O.; Caspari, A.; Caspari, S.; Dolek, M.; Harpke, A.; Hermann, G.; Joger, H.G.; Kolligs, D.; Lange, A.; Müller, D.; Nunner, A.; Pollrich, S.; Reinelt, T.; Rennwald, E.; Schmitz, O.; Schönborn, C.; Schulze, W.; Schurian, K.; Strätling, R.; Wachlin, V. &amp; Wiemers, M. (2025): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Papilionoidea et Zygaenidae) Deutschlands. – Naturschutz und</p>

