

Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Satyrium ilicis (Esper, 1779)
Deutscher Name Brauner Eichen-Zipfelfalter
Organismengruppe Tagfalter und Widderchen
Rote-Liste-Kategorie Stark gefährdet
Verantwortlichkeit Deutschlands Allgemeine Verantwortlichkeit
Aktuelle Bestandssituation selten
Langfristiger Bestandstrend starker Rückgang
Kurzfristiger Bestandstrend starke Abnahme
Vorherige Rote-Liste-Kategorie Stark gefährdet
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Kategorie unverändert
Kommentar zur Gefährdung S. ilicis ist eine typische Lichtwaldart, die in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Stabile Bestände existieren in den Niederwäldern der Hauberge in Hessen und den aktiven Mittelwäldern des südlichen Steigerwaldes in Bayern (Hermann 2020, Graser et al. 2023). Im Norden und Osten Deutschlands sowie im südlichen Bayern gibt es nur wenige kleine und isolierte Vorkommen. Die Populationen im Saarland sind trotz Schutzmaßnahmen nicht gesichert (Strätling 2010). In Baden-Württemberg ist die Art aktuell in vier Regionen vorhanden, verzeichnet dort aber Bestandsrückgänge (Hermann 2024, Hermann & Trautner 2019). Eine detaillierte Darstellung der Gefährdungssituation findet sich in Form eines Einstufungsbeispiels in Kapitel (siehe Publikation für Kapitelnummer).
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Musche, M.; Albrecht, M.; Becker, J.; Bittermann, J.; Blanckenhagen, B. von; Böck, O.; Caspari, A.; Caspari, S.; Dolek, M.; Harpke, A.; Hermann, G.; Joger, H.G.; Kolligs, D.; Lange, A.; Müller, D.; Nunner, A.; Pollrich, S.;

Reinelt, T.; Rennwald, E.; Schmitz, O.; Schönborn, C.; Schulze, W.; Schurian, K.; Strätling, R.; Wachlin, V. & Wiemers, M. (2025): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Papilionoidea et Zygaenidae) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (11): 94 S.