


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Melitaea parthenoides Keferstein, 1851
Deutscher Name Westlicher Scheckenfalter
Organismengruppe Tagfalter und Widderchen
Rote-Liste-Kategorie Stark gefährdet
Verantwortlichkeit Deutschlands Allgemeine Verantwortlichkeit
Aktuelle Bestandssituation sehr selten
Langfristiger Bestandstrend starker Rückgang
Kurzfristiger Bestandstrend starke Abnahme
Vorherige Rote-Liste-Kategorie Stark gefährdet
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Kategorie unverändert
Kommentar zur Gefährdung M. parthenoides besitzt nur am Kaiserstuhl, im Alb-Wutach-Gebiet und im Allgäu größere Vorkommen. Lediglich die Bestände im Alb-Wutach-Gebiet in Baden-Württemberg sind derzeit als stabil zu bewerten. Dagegen sind zum Teil starke Abnahmen im Württembergischen Allgäu (Bamann 2017) und im Bayerischen Allgäu zu verzeichnen. Die Ursachen sind noch unklar. Sowohl Intensivierung als auch Nutzungsaufgabe dürften eine Rolle spielen (Hafner 2020).
Weitere Kommentare Die Vorkommen befinden sich an der nordöstlichen Verbreitungsgrenze in Europa. Am Kaiserstuhl und im Alb-Wutach-Gebiet werden zwei Generationen ausgebildet, im Alpenvorland ist die Art einbrütig.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Musche, M.; Albrecht, M.; Becker, J.; Bittermann, J.; Blanckenhagen, B. von; Böck, O.; Caspari, A.; Caspari, S.; Dolek, M.; Harpke, A.; Hermann, G.; Joger, H.G.; Kolligs, D.; Lange, A.; Müller, D.; Nunner, A.; Pollrich, S.;

Reinelt, T.; Rennwald, E.; Schmitz, O.; Schönborn, C.; Schulze, W.; Schurian, K.; Strätling, R.; Wachlin, V. & Wiemers, M. (2025): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Papilionoidea et Zygaenidae) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (11): 94 S.