


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Erebia styx (Freyer, 1834)
Deutscher Name Styx-Erebie
Organismengruppe Tagfalter und Widderchen
Rote-Liste-Kategorie Vom Aussterben bedroht
Verantwortlichkeit Deutschlands Allgemeine Verantwortlichkeit
Aktuelle Bestandssituation extrem selten
Langfristiger Bestandstrend mäßiger Rückgang
Kurzfristiger Bestandstrend mäßige Abnahme
Vorherige Rote-Liste-Kategorie Extrem selten
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Aktuelle Verschlechterung der Einstufung
Kommentar zur Gefährdung E. styx ist vor allem in niedrigeren Lagen durch Gehölzaufwuchs auf offenen Felsstandorten gefährdet, so z.B. im Raum Bad Reichenhall (Böck 2020). Sie besitzt im gesamten Alpenraum nur isolierte Vorkommen. Die ehemaligen Vorkommen in den Chiemgauer Alpen konnten aktuell nicht bestätigt werden. Aus dem angrenzenden Vorarlberg (Österreich) wurde ein langfristiger Bestandsrückgang zwischen 60 und 100% auf Basis besiedelter 1-km²-Rasterfelder gemeldet (Huemer et al. 2022). Im Land Salzburg wurde der langfristige Bestandsrückgang auf 40–49% geschätzt (Gros 2023). Die Verbreitung dort ist wie auf bayerischer Seite sehr lokal. Eine wesentliche Maßnahme zur Erhaltung der Art ist die Entfernung von Gehölzen auf ehemaligen Felsfluren und auf Straßenstützhängen (Böck 2020). Zudem sollte auf die Aufforstung entsprechender Habitate verzichtet werden.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Musche, M.; Albrecht, M.; Becker, J.; Bittermann, J.; Blanckenhagen, B. von; Böck, O.; Caspari, A.; Caspari, S.; Dolek, M.; Harpke, A.; Hermann,

G.; Joger, H.G.; Kolligs, D.; Lange, A.; Müller, D.; Nunner, A.; Pollrich, S.; Reinelt, T.; Rennwald, E.; Schmitz, O.; Schönborn, C.; Schulze, W.; Schurian, K.; Strätling, R.; Wachlin, V. & Wiemers, M. (2025): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Papilionoidea et Zygaenidae) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (11): 94 S.