

Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Wiedemannia beckeri (Mik, 1889)
Synonyme bzw. Name in der vorherigen Roten Liste Wiedemannia alpina Vaillant, 1967, non (Engel, 1918), nec Vaillant, 1953; Wiedemannia alticola Vaillant, 1950; Wiedemannia glaciala Wagner, 1985
Organismengruppe Langbein-, Tanz- und Rennraubfliegen
Rote-Liste-Kategorie Gefährdung unbekannten Ausmaßes
Verantwortlichkeit Deutschlands Nicht bewertet
Aktuelle Bestandssituation mäßig häufig
Langfristiger Bestandstrend Rückgang, Ausmaß unbekannt
Kurzfristiger Bestandstrend gleich bleibend
Sonderfälle Negativ wirksame(r) Risikofaktor(en) sind bekannt
Risikofaktoren Fragmentierung/Isolation der verbliebenen Teilpopulationen Verstärkte indirekte Einwirkungen, z.B. Verschlechterung der Habitatqualität
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Die Kategorieänderung ist nicht bewertbar, beispielsweise weil das Taxon in der alten Gesamtliste nicht enthalten oder nicht bewertet war (inkl. ♦ → ♦)
Kommentar zur Taxonomie Subgenus Chamaedipsia
Arealrand Nordwestlich
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Meyer, H. & Wagner, R. (2011): Rote Liste und Gesamtartenliste der

Langbein-, Tanz- und Rennraubfliegen (Diptera, Empidoidea; Dolichopodidae, Atelestidae, Empididae, Hybotidae, Microphoridae) Deutschlands. – In: Binot-Hafke, M.; Balzer, S.; Becker, N.; Gruttke, H.; Haupt, H.; Hofbauer, N.; Ludwig, G.; Matzke-Hajek, G. & Strauch, M. (Red.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Band 3: Wirbellose Tiere (Teil 1). – Münster (Landwirtschaftsverlag). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (3): 87-140.