


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Ustilago agrostidis-palustris W. H. Davis ex Cif.
Synonyme bzw. Name in der vorherigen Roten Liste Ustilago striiformis (Westend.) Niessl p. p.; Ustilago striiformis (Westendorp) Niessl sec. Foitzik (1996) p. p.
Organismengruppe Phytoparasitische Kleinpilze
Rote-Liste-Kategorie Daten unzureichend
Verantwortlichkeit Deutschlands Nicht bewertet
Aktuelle Bestandssituation sehr selten
Langfristiger Bestandstrend Daten ungenügend
Kurzfristiger Bestandstrend Daten ungenügend
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Die Kategorieänderung ist nicht bewertbar, beispielsweise weil das Taxon in der alten Gesamtliste nicht enthalten oder nicht bewertet war (inkl. ♦ → ♦)
Kommentar zur Taxonomie Taxon aus der Ustilago striiformis-Gruppe; in Kruse et al. (2018) wurde gezeigt, dass auf der Gattung Agrostis mindestens zwei verschiedene Vertreter der Ustilago striiformis-Gruppe vorkommen, einer davon auf Agrostis gigantea (U. agrostidis-palustris) und die andere Art auf Agrostis stolonifera und A. rupestris (U. jagei). Die engere Artzugehörigkeit von Befällen auf Agrostis capillaris wurde bisher nicht näher untersucht, so dass entsprechende Funde bis auf Weiteres nur der Ustilago striiformis-Gruppe zugeordnet werden können.
Weitere Kommentare Der erstmals 2012 in Deutschland nachgewiesene Pilz wurde vorher vermutlich übersehen und wird als indigen eingestuft.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Thiel, H.; Klenke, F.; Kruse, J.; Kummer, V. & Schmidt, M. (2023): Rote Liste und Gesamtartenliste der phytoparasitischen Kleinpilze Deutschlands [Brandpilzverwandte (Exobasidiomycetes p.p.,

Ustilaginomycetes p.p.), Rostpilzverwandte (Kriegeriaceae p.p., Microbotryales, Pucciniales), Wurzelknöllchenpilze (Entorrhizaceae), Echte Mehltäupilze (Erysiphaceae), Falsche Mehltäue (Peronosporaceae p.p.) und Weißroste (Albuginaceae)]. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (5): 347 S.