


Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name <i>Ustilago neocopinata</i> J. Kruse & Thines Synonyme bzw. Name in der vorherigen Roten Liste <i>Ustilago striiformis</i> (Westend.) Niessl p. p.; <i>Ustilago striiformis</i> (Westendorp) Niessl sec. Foitzik (1996) p. p. Organismengruppe Phytoparasitische Kleinpilze
Rote-Liste-Kategorie Ungefährdet
Verantwortlichkeit Deutschlands Nicht bewertet
Aktuelle Bestandssituation mäßig häufig
Langfristiger Bestandstrend stabil
Kurzfristiger Bestandstrend Daten ungenügend
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Die Kategorieänderung ist nicht bewertbar, beispielsweise weil das Taxon in der alten Gesamtliste nicht enthalten oder nicht bewertet war (inkl. ♦ → ♦)
Kommentar zur Taxonomie Taxon aus der <i>Ustilago striiformis</i>-Gruppe; der bisher zu <i>U. striiformis</i> gerechnete Befall auf <i>Dactylis glomerata</i> bildet nach Kruse et al. (2018) eine eigenständige Art. Weitere Kommentare Befälle auf <i>Dactylis polygama</i> werden aufgrund der nahen Verwandtschaft des Wirtes mit <i>D. glomerata</i> ebenfalls unter dieser Art geführt, obwohl deren phylogenetische Identität noch nicht untersucht wurde.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Thiel, H.; Klenke, F.; Kruse, J.; Kummer, V. & Schmidt, M. (2023): Rote Liste und Gesamtartenliste der phytoparasitischen Kleinpilze Deutschlands [Brandpilzverwandte (Exobasidiomycetes p.p., Ustilaginomycetes p.p.), Rostpilzverwandte (Kriegeriaceae p.p., Microbotryales, Pucciniales), Wurzelknöllchenpilze (Entorrhizaceae), Echte Mehltäupilze (Erysiphaceae), Falsche Mehltäue (Peronosporaceae)

