

Artensteckbrief



Wissenschaftlicher Name Aecidium anemones-silvestris Kleb.
Organismengruppe Phytoparasitische Kleinpilze
Verantwortlichkeit Deutschlands Nicht bewertet
Aktuelle Bestandssituation ausgestorben/verschollen
Letzter Nachweis 1892
Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste Die Kategorieänderung ist nicht bewertbar, beispielsweise weil das Taxon in der alten Gesamtliste nicht enthalten oder nicht bewertet war (inkl. ♦ → ♦)
Kommentar zur Taxonomie Zu dieser Anamorphe ist keine Teleomorphe bekannt.
Kommentar zur Gefährdung Der bisher einzige Nachweis des Pilzes in Deutschland (leg. P. Graebner) erfolgte 1892 im brandenburgischen Rüdersdorf bei Berlin (Klebahn 1912-1914). Die Wirtspflanze wurde am Typusfundort „Rüdersdorfer Kalkberge“ durch den Steinbruchbetrieb ausgerottet.
Einbürgerungsstatus Indigene oder Archäobiota
Quelle Thiel, H.; Klenke, F.; Kruse, J.; Kummer, V. & Schmidt, M. (2023): Rote Liste und Gesamtartenliste der phytoparasitischen Kleinpilze Deutschlands [Brandpilzverwandte (Exobasidiomycetes p.p., Ustilaginomycetes p.p.), Rostpilzverwandte (Kriegeriaceae p.p., Microbotryales, Pucciniales), Wurzelknöllchenpilze (Entorrhizaceae), Echte Mehltapilze (Erysiphaceae), Falsche Mehltäue (Peronosporaceae p.p.) und Weißroste (Albuginaceae)]. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 170 (5): 347 S.